



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订购热线: 400-168-3301 或 800-8283301
技术咨询: info@beyotime.com
高通量测序服务: ngs@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

上海碧云天生物科技有限公司

高通量测序生物送样要求

High-throughput Sequencing Sample Requirements

样品类型	应用类型	样品要求 (DNA、RNA 样品)
二代测序 · Illumina 平台 ·		
gDNA	HiSeq X 全基因组测序	<ul style="list-style-type: none">基因组 DNA 用 TE 溶解; 总量$\geq 0.5\mu\text{g}^1$; $\text{OD}_{260/280}=1.8\text{-}2.0$; 浓度$\geq 50\text{ng}/\mu\text{L}$。DNA 完整纯净, 无降解, 无细胞凋亡, 无 RNA、蛋白质、多糖、试剂成分等残留或污染。
gDNA 和 FFPE gDNA	Agilent SureSelect 全外显子组测序	<ul style="list-style-type: none">基因组 DNA 用 TE 溶解; 总量(Qubit 测定)$\geq 2\mu\text{g}^1$; $\text{OD}_{260/280}=1.8\text{-}2.0$; 浓度$\geq 50\text{ng}/\mu\text{L}$。 <p>注意: SureSelect 试剂盒的外显子捕获区域有 50Mb 和 75Mb 两种, 请指明所需大小。 注意: 若样品来源为非人物种, 请特别指明。</p>
gDNA 和 FFPE gDNA	Roche NimbleGen 全外显子组测序	<ul style="list-style-type: none">基因组 DNA 用 TE 溶解; 总量$\geq 2\mu\text{g}^1$; $\text{OD}_{260/280}=1.8\text{-}2.0$; 浓度$\geq 50\text{ng}/\mu\text{L}$。 <p>注意: NimbleGen 试剂盒的外显子捕获区域有不同大小, 请指明所需大小。 注意: 若样品来源为非人物种, 请特别指明。</p>
Total RNA	TruSeq 法 <ul style="list-style-type: none">转录组测序small RNA 测序	<ul style="list-style-type: none">总 RNA 溶解于 DEPC-水或者 RNase-free 的缓冲液中。总量$\geq 2\mu\text{g}^1$; $\text{OD}_{260/280}\geq 2.0$; 完整性 $\text{RIN}\geq 8.0$; 浓度$\geq 100\text{ng}/\mu\text{L}$。 <p>注意: Small RNA 测序使用总 RNA 为起始材料, 分离纯化的 Small RNA 也可以接受, 但非必要。 注意: 如果客户提供分离纯化的 Small RNA 作为 Small RNA 测序的起始材料, 请特别指明。</p>
Total RNA	Ribo-Zero 法 <ul style="list-style-type: none">lncRNA 测序FFPE RNA 测序降解 RNA 测序	<ul style="list-style-type: none">总 RNA 溶解于 DEPC-水或者 RNase-free 的缓冲液中; $\text{OD}_{260/280}\geq 2.0$; 浓度$\geq 100\text{ng}/\mu\text{L}$。所需样品量¹与降解程度有关: $\text{RIN}\geq 8.0$, $\geq 3\mu\text{g}$; $\text{RIN}=6.0\text{-}8.0$, $\geq 4\mu\text{g}$; $\text{RIN}<6.0$, $\geq 6\mu\text{g}$。lncRNA 测序采用 Ribo-zero 方法。$\text{RIN}<6.0$ 的降解严重的 RNA 样品, 以及 FFPE RNA 样品, 建议 Ribo-Zero 法, 不建议 TruSeq 法。 <p>注意: Ribo-Zero 法适用于降解样品(低 RIN 值) RNA 测序、FFPE RNA 测序、lncRNA 测序等。</p>
客户自制文库 (Customer library)	<ul style="list-style-type: none">包 flow cell 测序包 lane 测序包数据量测序	<ul style="list-style-type: none">DNA 文库溶解于 Illumina Resuspension Buffer (RSB) 或其他品牌建库试剂盒的对应缓冲液中; 总量$\geq 100\text{ng}^1$; $\text{OD}_{260/280}=1.8\text{-}2.0$; 浓度$\geq 5\text{ng}/\mu\text{L}$。请客户提供以下信息, 以利于针对性地采取措施, 确保获得最高数据质量:<ul style="list-style-type: none">文库类型: 如 PCR 产物、简化基因组、甲基化、Amplicon、16S rRNA 扩增子、FFPE 等等;文库的混合比例(pooling ratio);文库中所使用的 barcode 序列表及 barcode 长度;插入片段长度或者文库的整体长度, 文库浓度, Agilent 2100 Bioanalyzer 质检图(可以选择性提供, 用于检查文库的片段长度分布);建库所用试剂盒名称及版本(用于判断与 Illumina 平台的兼容性)。如果是特殊的自行设计的方法请适当说明。请指定 cluster generation 的上样浓度。请指定是否掺入 PhiX, 以及掺入比例。

样品类型	样品要求 (组织、细胞、血液样品)
组织、细胞、血液样品 · 所有平台 ·	
细胞	提取 DNA: 收获培养的细胞后, 离心去除培养液, PBS 洗 2 次, 立即置液氮中快速冷冻。液氮冷冻半小时后, 保存于-80°C 冰箱, 干冰运输。 提取 RNA: 收获培养的细胞后, 离心去除培养液, PBS 洗 2 次, 立即用 TRIzol 处理获得细胞裂解液 ² 。细胞裂解液保存于-80°C 冰箱, 干冰运输。详细操作流程请参阅 TRIzol 说明书。
新鲜冷冻	提取 DNA: 获得新鲜的组织样品后, 切割成适当大小, 立即置液氮中快速冷冻。液氮冷冻半小时后, 保存于-80°C 冰箱, 干冰运输。

组织	提取 RNA: 获得新鲜的组织样品后，立即切成所有方向都<0.5cm 的小块，整个浸没在 5 倍体积的 RNAlater 中，4°C 浸泡过夜，然后保存于-80°C 冰箱，干冰运输。详细操作流程请参阅 RNAlater 说明书。
石蜡包埋组织(FFPE)	<ul style="list-style-type: none"> 每个样品 8~10 片石蜡片，每片厚度 4~5μm。 请提供一片 H&E 染片，用于定位肿瘤细胞。 无论用于提取 DNA 还是 RNA，石蜡片均常温保存，常温运输。
	提取 gDNA: <ul style="list-style-type: none"> 抗凝剂：可用枸橼酸钠或 EDTA，不建议用肝素。 外周血总量：≥2ml。 样品直接保存于-80°C 冰箱，干冰运输。 提取 cell-free 游离 DNA: <ul style="list-style-type: none"> 抗凝剂：可用枸橼酸钠或 EDTA，不建议用肝素。 外周血总量：≥6ml。 样品直接保存于-80°C 冰箱，干冰运输。
外周血	提取总 RNA（含 small RNA): <ul style="list-style-type: none"> 抗凝剂：可用枸橼酸钠或 EDTA，不建议用肝素。 外周血总量：≥4ml。 推荐 3 种保存、运输方法，任选其一： <ul style="list-style-type: none"> 用 PAXgene RNA 采血管，混匀之后保存于-80°C 冰箱，干冰运输。详细流程请参阅 PAXgene 说明书； 外周血样品用 TRIzol LS 处理获得裂解液²，保存于-80°C 冰箱，干冰运输。请参阅 TRIzol LS 说明书； 从外周血分离白细胞，用 TRIzol LS 处理成裂解液²，裂解液保存于-80°C 冰箱，干冰运输。请参阅 TRIzol LS 说明书。 提取 cell-free 游离 RNA: <ul style="list-style-type: none"> 抗凝剂：可用枸橼酸钠或 EDTA，不建议用肝素。 外周血总量：≥6ml。 推荐 3 种保存运输方法，任选其一： <ul style="list-style-type: none"> 用 PAXgene RNA 采血管，混匀之后保存于-80°C 冰箱，干冰运输。详细流程参阅 PAXgene 说明书； 外周血样品用 TRIzol LS 处理获得裂解液²，保存于-80°C 冰箱，干冰运输。请参阅 TRIzol LS 说明书； 从外周血分离白细胞，用 TRIzol LS 处理成裂解液²，裂解液保存于-80°C 冰箱，干冰运输。请参阅 TRIzol LS 说明书。
血浆 血清	提取 DNA: <ul style="list-style-type: none"> 抗凝剂：可用枸橼酸钠或 EDTA，不建议用肝素。 血浆或血清总量：≥2ml。 样品直接保存于-80°C 冰箱，干冰运输。 提取总 RNA 或 small RNA: <ul style="list-style-type: none"> 抗凝剂：可用枸橼酸钠或 EDTA，不建议用肝素。 血浆或血清总量：≥2ml。 血浆和血清样品可以用 TRIzol LS 处理获得裂解液²，裂解液保存于-80°C 冰箱，干冰运输。详细流程请参阅 TRIzol LS 说明书。 <p>注 意：液体样品不建议使用 RNAlater 或 TRIzol²。</p>

注：

- 除注明外，DNA 及 RNA 浓度采用 NanoDrop 测定。对于同一个样品，NanoDrop 与 Qubit 测定得到的浓度在数值上有差别。
- TRIzol 与 TRIzol LS 是两种不同的试剂。TRIzol 适用于固体样品，推荐使用碧云天的 R0011 Beyozol (总 RNA 抽提试剂)或 R0016 Trizol (总 RNA 抽提试剂)；TRIzol LS 适用于液体样品。

样品包装运输注意事项 **重要信息，注意阅读。**

- 样品寄出前，请给ngs@beyotime.com或碧云天高通量测序技术服务人员邮箱发送一份填写完整的电子版《碧云天高通量测序生物样品信息表》；如有特殊情况，请在快递发出前与碧云天高通量测序技术服务人员电话联系，比如客户自送样品、提前寄送样品、有其它物品随样品一起快递需要额外点收等，以便安排人手，防止丢失。
- 请将填写完整的纸质版《碧云天高通量测序生物样品信息表》以及其它技术资料(如有)密封于塑料袋内，随样品一起寄出；合同和硬盘请另单快递给对应接收人员，不要与样品一起快递，既避免物流分拣环节导致合同和硬盘遗失，也避免干冰或蓝冰冷凝水可能损坏文件和硬盘。
- 如果需要进行生物信息学分析，请在《碧云天高通量测序生物样品信息表》的“项目描述”栏目里注明。
- 样品置于1.5ml或其它型号的低吸附离心管里；管上清楚标明样品名称，样品管上的名称要与碧云天高通量测序生物样品信息表一致，请双人核实无误；用parafilm膜把样品管缠紧密封好；将样品管置于保护用的50ml离心管或其它容器里，用适量纸、纱布或棉花塞紧，防止样品管晃荡，旋紧盖子。
- 根据样品类型选择室温、蓝冰或者干冰包装，选择最快的运输方式以免样品降解；合理安排发货时间，避免周六、周日或法定节假日到达，以免样品丢失。低温运输采用安全的干冰，不要用危险的液氮；液氮如果渗进样品管，在温度发生变化时因体积膨胀有可能导致爆炸，毁坏样品。
- 项目结束后，剩余样品免费保存 6 个月；如果需要延长保存期或者返还，请提前与碧云天高通量测序技术服务人员联系。